

WSKAZÓWKI DO ĆWICZEŃ
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM w Warszawie
B.Ciszek

Głowa Szyja IV

Mięśnie wyrazowe twarzy. Nerw twarzowy. Tętnica twarzowa. Topografia okolicy przyuszniczo – żwaczowej

Wymienione niżej struktury trzeba umieć zlokalizować na preparacie, lub modelu, lub na schemacie oraz w atlasie

Punkty bazowe

a.facialis

glandula parotis

m.masseter

m.temporalis

a.temporalis superficialis

Inne struktury do praktycznego rozpoznania

Fascia parotidea

Fascia temporalis

v.facialis

n.facialis et rami

v.retromandibularis

ductus parotideus

m.buccinator

corpus adiposum buccae

m.orbicularis oris

m.orbicularis oculi

mm.zygomatici

m.labialis inf

m.depressor anguli oris

m.levator labii superioris

m.levator anguli oris

m.depressor labii inferioris

m.frontalis

galea aponeurotica

a.a.labiales

a.angularis

m.temporoparietalis

modiolus

rafe pterygomandibularis



Zagadnienia opisowe

Dół zażuchwowy (fossa retromandibularis): położenie, zawartość, ograniczenia, połączenia

Ślinianka przyuszna, ujście przewodu wyprowadzającego

Zespolenia gałęzi tt.twarzowych i drogi krążenia obocznego

Zespolenia żyły twarzowej drogi odpływu krwi żylnej

Jądra n. twarzowego, n. pośredni, zwój kolanka, gałęzie nerwu twarzowego, składniki n.twarzowego

Centralny i obwodowy niedowład nerwu twarzowego