

WSKAZÓWKI DO ĆWICZEŃ
DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM w Warszawie
B.Ciszek

Głowa Szyja II

Mięśnie szyi: mostkowo-obojęczykowo-sutkowy, nadgnykowe, podgnykowe, pochyłe. Gruczoł tarczowy. Gruczoły przytarczyczne. Pęczek naczyniowo-nerwowy szyi. Tętnica szyjna wspólna. T.podobojczykowa

Punkty bazowe

a.carotis communis common carotid artery
a.carotis interna internal carotid artery
a.carotis externa external carotid artery
v.jugularis interna internal jugular vein
v.jugularis externa external jugular vein
n.vagus
a.subclavia subclavian artery
v.subclavia jw vein
glandula thyroidea thyroid gland
a.facialis facial artery
n.hypoglossus hypoglossal nerve
m.digastricus digastric muscle
m.mylohyoideus mylohyoid muscle
m.sternocleidomastoideus sternocleidomastoid muscle
m.scalenus anterior
plexus brachialis brachial plexus

Inne struktury do praktycznego rozpoznania

m.sternohyoideus, sternohyoid muscle
m.omohyoideus dalej j.w.
m.sternothyreoideus
m.thyrohyoideus
m.stylohyoideus
m.geniohyoideus
vagina carotica carotid vagina
sinus caroticus
glandula parathyroidea parathyroid gland
a.thyroidea superior sup.thyroid artery
a.vertebralis vertebral artery
truncus thyrocervicalis thyrocervical trunk
a.thyroidea inferior inferior thyroid artery
a.thoracica interna internal thoracic artery
isthmus glandulae thyroideae isthmus of the thyroid gland
lobus glandulae thyroideae lobe of the thyroid gland
m.scalenus medius middle scalenus muscle
m.scalenus post.

Zagadnienia opisowe

Topografia powrózka naczyniowo-nerwowego szyi

Budowa topografia i czynność tarczycy i przytarczyc

Przestrzeń i trójkąt podżuchwowy ,topografia struktur.

Rozwory mięśni pochyłych

Część nadobojczykowa splotu ramiennego: korzenie, pnie, połączenia ze splotem szyjnym.

Stosunek zawartości rozworów i otworu górnego klatki piersiowej – szczyt płuca, osklepek powikłania nakłuc.

Grupy węzłów chłonnych szyi: nodi lymphatici: occipitales, mastoidei, parotidei, faciales, linguales, submentales, submandibulares, cervicales anteriores (w tej grupie n.l.retropharyngei), cervicales laterales (w tej grupie spf. et prof., jugulodigastricus , juguloomohyoideus) supraclaviculares.